

Aéro-Sols

Projet de surveillance des impacts potentiels des retombées atmosphériques générées par les activités de l'aéroport de Liège

Réunion citoyenne
21 novembre 2024



Wallonie

Institut Scientifique de Service Public



- Activités scientifiques et techniques dans le domaine environnemental
- Métrologie environnementale (surveillance)
- Laboratoire de référence en Wallonie




Asbl Eco-Impact



- Réseau d'experts au service de l'environnement et de la santé publique

Programme

- 45 min de présentation
- Questions-réponses



Cadre à respecter

- Prise de parole respectant chacun, éviter de confondre les problèmes et les personnes
- Sujet du jour : étude « Aéro-Sols »
 - Les autres sujets (autres nuisances, autres projets, autres études, autres impacts environnementaux) ne seront pas traités ici

Point de départ

- Projet initié en réponse aux signalements de riverains des aéroports, qui ont observé des taches semblables à des hydrocarbures dans leur jardin. Ils veulent savoir si l'aéroport est à l'origine de ces substances.



- ➔ ISSeP sollicité par Ministre Environnement pour rédiger protocole d'étude

Objectifs



- L'étude Aéro-Sols s'est inspirée des surveillances réalisées autour d'autres aéroports européens pour étudier pendant 1 an la qualité de l'air autour des 2 principaux aéroports wallons.



Objectif de la mise en place de ce réseau de mesure: déterminer si ces dépôts constatés par les riverains sont en lien avec les activités aéroportuaires.



<https://www.sudinfo.be/id65197/article/2018-07-16/plus-de-38-millions-de-voyageurs-sont-passes-par-laeroport-de-charleroi-au-1er>



https://www.studiobus.uliege.be/cms/c_6035086/fr/aeroport-de-liege-le-mur-du-son




Participation citoyenne




Périmètre d'étude défini selon :

- Etape 1 : Exploitation données des Plans d'Exposition au Bruit (PEB) des deux aéroports wallons (WalOnMap)
- Etape 2 : Estimation du nombre de parcelles résidentielles par zone
- Etape 3 : Positionnement des stations du réseau de surveillance déjà en place actuellement
- Etape 4 : Adaptation des ellipses



Sélection des participants


- Présélection selon les localisations idéales
 - 2 stations en amont de la piste
 - 2 stations en aval de la piste
 - 2 points dans la direction perpendiculaire à la piste



Réunion citoyenne 23/05/2023 => 87 volontaires


- Favoriser zones avec beaucoup de volontaires pour répondre à la demande des riverains
- Stations suffisamment espacées l'une de l'autre et réparties spatialement dans la zone d'étude.
- Stations suffisamment éloignées des stations de mesure ISSeP existantes

Stations ISSeP existantes – mesures permanentes




Stations sélectionnées à Liège

- 6 stations « Aéro-Sols »
- 1 témoin Liège
- 4 stations *ISSeP* existantes au niveau de l'aéroport
- 1 référence (4 stations) rurale => Havelange (province de Namur)
- 1 référence (4 stations) urbaine => Liège



Polluants

- Présents dans les retombées atmosphériques :
 - Poussières d'un certain poids émises dans l'air qui se déposent dans l'environnement (sols, végétaux, rivières)
 - Meilleure évaluation de la pollution actuelle



Dispositifs de prélèvement



➤ Jauges

- En plastique: métaux
- En verre : HAP et HC
- Récolte tous les 28 jours sur 1 an
- Du 29/06/2023 au 27/06/2024



➤ Biosurveillance

- Graminées (Ray grass d'Italie)
- Avant exposition : graminées cultivées sous serre
- 2 campagnes de 28 jours :
 - 27/06 au 27/07/2023
 - 12/09 au 10/10/2023



Quelques chiffres :

- 2 aéroports (Liège et Charleroi)
- 6 jardins par aéroport
- 2 stations de référence en milieu urbain
- 14 points de mesure au total
- Plusieurs polluants mesurés : métaux, hydrocarbures et HAPs

Réalisé à ce jour :

- 13 relèves de jauges soit 182 prélèvements
- 28 récoltes de graminées

Aéro-Sols

RÉSULTATS

Présentation générale des résultats

➤ Biosurveillance



- Comparaison à une valeur repère rurale = niveau de concentration présent dans l'environnement sans lien direct avec une source locale ou spécifique de pollution
- Comparaison au « témoin Liège » et « témoin serre »

⇒ **Unités de mesure**: concentration dans les plantes => quantité de polluant par quantité de plante, ici mg/kg. L'unité est suivie de la précision MS (matière sèche) car le résultat est exprimé en poids sec.

Présentation générale des résultats




➤ Jauges



- Dépôts atmosphériques : Absence réglementation EU ou WAL

| Substances | Dépôts ($\mu\text{g}/\text{m}^2.\text{j}$) | Période | Source |
|------------|--|---------|----------------|
| Cadmium | 2 | 1 an | TA-Luft (2021) |
| Nickel | 15 | 1 an | TA-Luft (2021) |
| Plomb | 100 | 1 an | TA-Luft (2021) |
| Zinc | 400 | 1 an | Opair (2024) |



- ⇒ **Unités de mesure:** quantité de polluant (μg donc 0,000001 g) par unité de surface (la surface de l'entonnoir qui surplombait la jauge, exprimée en m^2) et par unité de temps (ici par jour) $\Rightarrow \mu\text{g}/\text{m}^2.\text{j}$
- ⇒ Comparaison des valeurs annuelles moyennes des stations \gg aux stations de référence rurale et urbaine et, si disponible, aux valeurs réglementaires.

Présentation générale des résultats



➤ LOQ

- Limite de quantification (*Limit Of Quantification*)
- Valeur spécifique au polluant étudié et à la méthode d'analyse utilisée
- = Concentration en-dessous de laquelle le laboratoire ne sait plus doser un polluant



=> Certains polluants n'ont pas été quantifiés dans de nombreux échantillons car leur concentration était inférieure à la LOQ (indiqué <LOQ dans les tableaux de résultats).

➤ Métaux


➤ cadmium, chrome, cuivre, manganèse, nickel, plomb et zinc

- Emis dans l'atmosphère par des **processus naturels** (érosion du sol, ...)
- Résultent d'**activités humaines** telles que la combustion de combustibles fossiles (industrie, chauffage, transport), métallurgie, incinération des déchets...
- Les activités aéroportuaires peuvent émettre des métaux dans environnement
 - Pneus, poussière des freins,...
 - Contraintes mécaniques et corrosion
 - Poussière produite lors de atterrissage et freinage des avions




Résultats : métaux – cadmium (1/7)

➤ Jauges




➤ Biosurveillance




Résultats : métaux – cadmium (1/7)

➤ Jauges




Résultats : métaux – chrome (2/7)

➤ Jauges




➤ Biosurveillance




Résultats : métaux – chrome (2/7)

➤ Jauges




Résultats : métaux – cuivre (3/7)

➤ Jauges




➤ Biosurveillance



Résultats : métaux – cuivre (3/7)


➤ Jauges



Résultats : métaux – manganèse (4/7)

➤ Jauges


➤ Biosurveillance



=> Non mesuré


Résultats : métaux – manganèse (4/7)

➤ Jauges




Résultats : métaux – nickel (5/7)

➤ Jauges




➤ Biosurveillance




Résultats : métaux – nickel (5/7)

➤ Jauges




Résultats : métaux – plomb (6/7)

➤ Jauges




➤ Biosurveillance




Résultats : métaux – plomb (6/7)

➤ Jauges




Résultats : métaux – zinc (7/7)

➤ Jauges




➤ Biosurveillance



Résultats : métaux – zinc (7/7)

➤ Jauges



➤ Hydrocarbures (fractions C5-C11 et C10-C40)

- Sources : produits pétroliers...
- Activités aéroportuaires:
 - Combustion carburant des avions
 - Transport et stockage dans l'enceinte et autour des aéroports




Résultats : Hydrocarbures (fractions C5-C11 et C10-C40)

➤ Jauges

- Aucune retombée en hydrocarbures (fractions C5-C11 et C10-C40) n'a pu être mise en évidence
- Tous les résultats sont < LOQ (Limite de quantification)
- Stations ISSeP existantes au niveau aéroport → < LOQ

➤ Biosurveillance

- Non mesuré



➤ Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

➤ 16 HAP

- Emis dans l'atmosphère par des **processus naturels** (volcans, feux de forêt, ...)
- Résultent majoritairement d'**activités humaines** telles que la combustion de combustibles fossiles (industrie, chauffage, trafic, incinération, centrales électriques), raffinage du pétrole... => secteur résidentiel et production d'énergie
- Les activités aéroportuaires peuvent émettre des HAP dans l'environnement
 - Combustion carburant des avions
 - Transport dans l'enceinte et autour des aéroports



Résultats : HAP, valeurs de comparaison


➤ Jauges

- Pas de norme ou de valeur seuil en Wallonie
- Pas de mesure de HAP dans les retombées atmosphériques en Wallonie
- Comparaison au témoin Liège

- Moyennes calculées en prenant la valeur de LOQ/2 pour les valeurs < LOQ

=> Si résultat < LOQ → on indique < LOQ

=> Si résultat > LOQ → on indique la valeur exprimée en ng/m².j




Résultats : Somme 16 HAP

➤ Jauges

| Somme 16 HAP (ng/m ² .j) | Moyenne | Nombre de valeurs | Nombre valeurs > LOQ | Concentration maximale mesurée |
|-------------------------------------|---------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| ID8 | < LOQ | 13 | 0 | < LOQ |
| ID102 | < LOQ | 13 | 0 | < LOQ |
| ID67 | < LOQ | 13 | 1 | 567 |
| ID80 | < LOQ | 13 | 0 | < LOQ |
| ID84 | < LOQ | 13 | 0 | < LOQ |
| ID86 | < LOQ | 13 | 0 | < LOQ |
| Témoin Liège | < LOQ | 11 | 0 | < LOQ |

Résultats : Somme 16 HAP

➤ Biosurveillance



Résultats : HAP

➤ HAP détectés


| HAP | Détection des HAP | |
|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| | Biosurveillance (12 mesures) | Jauges (78 mesures) |
| Anthracène | 0 | 0 |
| Benzo(k)fluoranthène | 0 | 0 |
| Benzo(b)fluoranthène | 0 | 0 |
| Indéno(1,2,3-c,d)pyrène | 0 | 0 |
| Acénaphtylène | 0 | 1 |
| Benzo(a)pyrène | 0 | 1 |
| Benzo(g,h,i)pérylène | 4 | 0 |
| Dibenzoanthracène | 5 | 0 |
| Acénaphtène | 6 | 0 |
| Naphtalène | 12 | 0 |
| Chrysène | 3 | 2 |
| Benzoanthracène | 4 | 4 |
| Phénanthrène | 9 | 16 |
| Pyrène | 12 | 17 |
| Fluoranthène | 12 | 28 |
| Fluorène | 9 | 33 |

Résultats : HAP

➤ Jauges

- Exemple détection du fluoranthène au cours de l'année

| Fluoranthène (ng/m ² .j) | 29/06 au 27/07/23 | 27/07 au 24/08/23 | 24/08 au 21/09/23 | 21/09 au 19/10/23 | 19/10 au 16/11/23 | 16/11 au 14/12/23 | 14/12/23 au 11/01/24 | 11/01 au 08/02/24 | 08/02 au 07/03/24 | 07/03 au 04/04/24 | 04/04 au 02/05/24 | 02/05 au 30/05/24 | 30/05 au 27/06/24 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ID8 | < LOQ | < LOQ | < LOQ | < LOQ | < LOQ | 41 | 31 | 22 | < LOQ | < LOQ | < LOQ | < LOQ | < LOQ |
| ID102 | < LOQ | < LOQ | < LOQ | < LOQ | < LOQ | 44 | 38 | 23 | 29 | < LOQ | < LOQ | < LOQ | < LOQ |
| ID67 | < LOQ | < LOQ | < LOQ | < LOQ | < LOQ | 63 | 42 | 33 | 28 | 35 | < LOQ | < LOQ | < LOQ |
| ID80 | 12 | < LOQ | < LOQ | < LOQ | < LOQ | 56 | 37 | 23 | 21 | 28 | < LOQ | < LOQ | < LOQ |
| ID84 | < LOQ | < LOQ | < LOQ | 13 | 41 | 62 | 53 | 39 | 37 | 38 | < LOQ | < LOQ | < LOQ |
| ID86 | < LOQ | < LOQ | < LOQ | < LOQ | < LOQ | 64 | 30 | 23 | < LOQ | < LOQ | < LOQ | < LOQ | < LOQ |
| Témoin Liège | | | < LOQ | 12 | < LOQ | 45 | 33 | 37 | 22 | 31 | 17 | < LOQ | < LOQ |




Que retenir de l'étude?

- Les résultats obtenus sont globalement uniformes, avec quelques valeurs ponctuellement plus élevées, mais toujours inférieures aux valeurs réglementaires quand elles existent
- Les résultats sont généralement proches des valeurs repères rurales (biosurveillance) et souvent inférieurs à la référence urbaine pour les métaux

En conclusion, aucun impact en provenance des activités aéroportuaires n'a pu être mis en évidence pour les polluants mesurés sur la période étudiée

Les résultats du projet Aéro-Sols rejoignent les conclusions d'études antérieures réalisées autour des aéroports de Leipzig et Munich (Allemagne).




PORTAIL WALLONIE.BE FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES mon espace personnel Presse

ISSeP NEWS ACTIVITÉS LABORATOIRE DE RÉFÉRENCE RECHERCHE PUBLICATIONS CONTACT RSE

Aéro-Sols

Étude des retombées atmosphériques autour des deux aéroports wallons (Liège et Charleroi)



Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la troisième newsletter parue en octobre 2024

[Newsletter Liège](#) [Newsletter Charleroi](#)

Les présentations données lors des premières réunions citoyennes en mai 2023 sont disponibles [ici pour Charleroi](#) et [ici pour Liège](#).

Réunions citoyennes finales

Présentation des résultats et des conclusions du projet de 20h à 22h.

Secteur privé et communes

Consulter les [services de l'ISSEP](#) proposés aux entreprises, aux particuliers et aux communes.

Amiante: analyse d'échantillon


[Procédure de rigueur](#) pour déposer ou envoyer un échantillon.

Demande d'analyse

Pour toute demande d'analyse en nos laboratoires, veuillez vous adresser à info@issep.be

[Avis sécurité fournisseurs](#)

[Conditions générales de vente](#)



Le **rapport** sera disponible dans le courant du mois de décembre 2024

➔ Sur le site de l'ISSEP: <https://www.issep.be/aero-sols/>

Informations complémentaires qualité de l'air en Wallonie sur <https://www.wallonair.be/fr/>

Merci !

Contacts

Pour de plus amples informations avant, pendant ou après l'étude, vous pouvez nous contacter :



Sophie Crevecoeur et Caroline Thiry (ISSeP)
ISSeP – Cellule Environnement-Santé, 200 Rue du Chéra – 4000 Liège
Email : aero-sols@issep.be



Marie Cors (Eco-Impact)
GSM : 0497/11 83 35
Email : marie.cors@eco-impact.be